

Koloskopie & Darmreinigung.pdf

Liebe Patientin, lieber Patient,

sie haben einen Behandlungstermin bei uns für eine:

Koloskopie (Darmspiegelung)
Polypektomie (Polypentfernung im Darm)

dann kommen Sie bitte zwischen 8:00 u. 9:00 Uhr direkt in die "Interne Aufnahme"
(bei geplanter ambulanter Untersuchung in das Sekretariat der Med. Klinik II, Frau Bleicher).

Wir benötigen von Ihrem behandelnden Arzt einen Einweisungsschein.

Falls Sie schon voruntersucht wurden, bringen Sie uns bitte aktuelle Blutwerte und vorhandene Vorbefunde mit.
Geplant ist die Untersuchung am selben Tag. Hierfür müssen Sie nüchtern und abgeführt zu Ihrem Termin erscheinen.

Das Abführmittel (Prepacol) lassen Sie sich bitte bei Ihren Hausarzt verschreiben oder Sie besorgen sich das Abführpräparat Tage vorher direkt bei uns.

Eine schriftliche Patienten -Aufklärung über die Untersuchung erhalten Sie ebenfalls bei uns.

Marcumar und Aspirin (ASS) müssen, soweit vertretbar, unter Überwachung ihres Hausarztes eine Woche vor der Untersuchung abgesetzt werden.

Andere wichtige Medikamente sollten auch vor der Untersuchung eingenommen werden. Diabetikermedikamente (Insulin, Tabletten) sollten auch nach Rücksprache mit dem Arzt angewandt werden.

Bereiten Sie sich darauf vor, dass Sie evtl. nach der Untersuchung am gleichen Tag wieder entlassen werden. Eine Fahrgelegenheit sollte organisiert werden.

Bei älteren oder gehandicapten Patienten führen wir auch stationär am Vortag im Krankenhaus ab. (Die Untersuchung findet dann am zweiten Behandlungstag statt.)

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Sie erreichen uns werktags unter der

☎ 0941/369-3780 (Interne Aufnahme)

☎ 0941/369-2051 (Sekretariat)

Mit freundlichen Grüßen

Mitarbeiter der Medizinischen Klinik II

Anlage: Schema Darmreinigung

Vorbereitung zur Dickdarmspiegelung

Am Tag vor der Untersuchung

- Normales Frühstück
- Zum Mittagessen leichte Kost (z.B. Suppen) Yoghurt) Kartoffelpüree
- dann reichlich Trinken (Mineralwasser ohne Kohlensäure, Tee)
- Abends klare Suppe.

- Um 16.00 Uhr 30 ml Lösung (Prepacol),
- etwa 2 Std. später 4 Tbl. Prepacol mit reichlich Flüssigkeit trinken.

Am Tag der Untersuchung

- Bitte beachten: Autofahren ist an diesem Tag nicht möglich, da in der Regel für die Untersuchung eine Beruhigungs- und Schmerzspritze gegeben wird.
- Kaffee oder Tee ohne Milch, reichlich Mineralwasser,
- Keine festen Speisen, die weitere Vorbereitung erfolgt mit Koloskopielösung
- Kleanprep) in der Regel in der Klinik.

Melden Sie sich gegen 8.00 Uhr bei geplant stationärer Behandlung in der "Internen Aufnahme" oder bei geplant ambulanter Untersuchung im Sekretariat der Med. Klinik II Frau Bleicher.

Ihre Endoskopie